


Per informazioni :
Segreteria Unità Operativa
Area Funzionale "C"
Via Roma 187- 85029 Venosa
dr.ssa Villonio Teresa - 0972 39385
email:angelo.bochicchio@aspbasilicata.it

AMBULATORIO MOBILE



Direttore Unità Operativa Area "C"
Dott. Angelo Bochicchio (cell. 3386585487)



REGIONE BASILICATA
Azienda Sanitaria Potenza – POTENZA
Ambito di VENOSA
Via Roma,187 VENOSA
SERVIZIO VETERINARIO
**U.O. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E
DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**
AREA "C"

Il Direttore dell'Unità Operativa
Dott. Angelo Bochicchio

STERILIZZAZIONE

In cosa consiste la sterilizzazione della cagna?

L'intervento consiste nella rimozione chirurgica delle ovaie e dell'utero (*ovarioisterectomia*). Dal 1998 il Direttore di struttura complessa, dott. Angelo Bochicchio con il suo team ha eseguito oltre 8.000 (ottomila) interventi chirurgici. L'intervento viene eseguito in anestesia generale ed inizia con l'incisione della parte centrale dell'addome nei pressi dell'ombelico (*linea alba*), di cute, sottocute, muscoli dell'addome e del peritoneo. Una volta inciso il peritoneo si procede all'asportazione delle ovaie, con la borsa ovarica e dell'utero. L'intervento termina con la sutura di peritoneo, muscoli addominali e a livello cutaneo si apporranno alcuni punti che si riassorbiranno dopo qualche giorno.



Prima dell'intervento

Nei giorni precedenti l'intervento è preferibile sottoporre la cagna a visita medica ed effettuare almeno gli esami ematologici di base. La sera

precedente l'intervento si raccomanda di somministrare un pasto leggero entro le ore 16.00, da quel momento in poi non dovrà più mangiare nulla. L'acqua dovrà naturalmente essere lasciata a disposizione. Prima di procedere all'intervento, al proprietario / detentore dell'animale gli verrà sottoposto il **modulo di consenso informato** che lo stesso dovrà accettare apponendovi la propria firma.



Il post-operatorio

Il post-operatorio, soprattutto in animali operati in giovanissima età, non presenta particolari problemi e la convalescenza è breve. Non appena il nostro amico comincia a svegliarsi dall'anestesia possiamo già portarlo a casa.

Valgono le indicazioni generali che si seguono dopo ogni anestesia: mettere l'animale in un posto tranquillo, al riparo dal freddo e dalla luce, dove non possa rischiare di cadere (*niente scale o divani per qualche ora*) o farsi male e **senza acqua o cibo**. Basteranno poche ore perché l'animale torni a gironzolare per casa tranquillamente. Di solito la copertura antibiotica è assicurata da farmaci a lunga azione, somministrati dopo l'intervento. E' necessario controllare i **punti di sutura** assicurandosi che l'animale non cerchi di toglierli; in questo caso

potrebbe essere utile fargli indossare un collare elisabettiano per qualche giorno.



I punti di sutura non dovranno essere rimossi in quanto saranno riassorbiti dopo qualche giorno. Al termine dell'intervento il proprietario / detentore dell'animale dovrà compilare una scheda di **soddisfazione del cliente** per esprimere il grado di soddisfazione sulla prestazione fruita.

Perché ricorrere alla sterilizzazione

- prevenire la nascita di cuccioli indesiderati;
- eliminare i problemi legati ad eventuali gravidanze isteriche (*pseudogavidanza*)

I vantaggi

- La sterilizzazione in età precoce riduce il rischio di tumori mammari. Il rischio di tumori aumenta ad ogni calore.
- Si evita anche il rischio di infezione uterina (*metrite-piometra*), patologie frequenti nella cagna anziana.
- Si evita l'estro o calore. Nella cagna il ciclo estrale dura 2 settimane circa, quindi, se non si è accoppiata, riprende dopo un intervallo di 6 mesi. Il calore è caratterizzato da scolo vulvare ematico, particolarmente fastidioso per il proprietario se il cane vive in casa.